


特应性皮炎

应按正确剂量和使用方法进行治疗




FTU = 从带有“标准”尺寸喷嘴(直径5毫米)的管子中挤出的、相当于成人食指指根皮肤皱褶处到食指尖长度的药膏量。

1 FTU = 足以薄薄地、均匀地涂抹“成人双手手掌(包括手指)”那么大面积皮肤的药膏量。



涂抹身体不同部位时单次剂量所需指尖单位数

1	1	1.5	1	1.5	约等于8 (4.0)		3至12个月
1.5	1.5	2	2	3	约等于14 (7.0)		1至2岁
1.5	2	3	3	3.5	约等于18 (9.0)		3至5岁
2	2.5	4.5	3.5	5	约等于25 (12.5)		6至12岁
2.5	3	6	16	24	约等于40 (20.0)		12岁及以上



1



2

参考文献

1. Bulat V等人. *Coll Antropol*. 2011;35(附录2):147-151.
2. Boguniewicz M等人. 《变态反应、气喘和免疫学纪事》. 2018;120:10-22.
3. Czarnowicki T等人. 《变态反应与临床免疫学杂志》. 2019;143:1-11.
4. DermNet NZ网站: <https://www.dermnetnz.org/topics/fingertip-unit/>. 查阅于2019年7月3日.
5. Eichenfield LF等人. 《美国皮肤病学会杂志》. 2014;71:116-132.
6. Eurisa(克立硼罗软膏)处方资料. 纽约州纽约市: 辉瑞公司, 2018年.
7. Eichenfield LF等人. 《美国皮肤病学会杂志》. 2014;71:327-349.
8. Eichenfield LF等人. 《儿科》. 2015年;136:554-565.

9. Gooderham MJ等人. 《美国皮肤病学会杂志》. 2018年;78(3 附录1):S28-S36.
10. 亨德森R. 患者平台有限公司网站: <https://patient.info/treatment-medication/steroids/fingertip-units-for-topical-steroids>. 查阅于2019年7月3日.
11. Van Zuuren EJ等人. *Cochrane*数据库系统修订版, 2017年;2:CD012119.
12. Weidinger S等人. 《自然综述-疾病导论》. 2018 2018;4:1.
13. 《药学杂志》, <https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/atopic-dermatitis-dupilumab-and-crisaborole-could-herald-a-new-era-in-treatment/20202337.article?firstPass=false>. 查阅于2019年7月25日.

本活动得到辉瑞公司教育经费的资助。
本活动由AKH Inc(全称:Advancing Knowledge in Healthcare)与 Catalyst Medical Education, LLC 联合举办。

