


# アトピー性皮膚炎

## 治療薬は、正しく投与され、塗布される必要があります



FTU = 成人の人差し指の先から第一関節まで「標準的な」口径5mmチューブの軟膏を出した量  
 1 FTU = 「成人の両手分」(指も含める)の皮膚面積に薄く均一に塗布するために適切な軟膏の量



顔と首を  
全体



腕と手を  
全体



脚と足を  
全体



胸と腹を  
全体



おしりを含む  
背中全体



全身  
(グラム)

1回塗布するために  
必要な部位ごとの  
FTU量

1	1	1.5	1	1.5	~8 (4.0)		3~12か月
1.5	1.5	2	2	3	~14 (7.0)		1~2歳
1.5	2	3	3	3.5	~18 (9.0)		3~5歳
2	2.5	4.5	3.5	5	~25 (12.5)		6~12歳
2.5	3	6	16	24	~40 (20.0)		13才以上



指も含めた片手  
(手の平と手の甲)

1



片足

2

### 参考文献

- Bulat V et al. *Coll Antropol.* 2011;35(suppl 2):147-151.
- Boguniewicz M et al. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2018;120:10-22.
- Czarnowicki T et al. *J Allergy Clin Immunol.* 2019;143:1-11.
- DermNet NZ のウェブサイト <https://www.dermnetnz.org/topics/fingertip-unit/> (2019年7月3日現在)
- Eichenfield LF et al. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71:116-132.
- Eurisa (crisaborole 軟膏) 処方情報。New York, NY: Pfizer Inc; 2018.
- Eichenfield LF et al. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71: 327-349.
- Eichenfield LF et al. *Pediatrics.* 2015;136:554-565.
- Gooderham MJ et al. *J Am Acad Dermatol.* 2018;78(3 suppl 1):S28-S36.
- Henderson R. Patient Platform Limited のウェブサイト <https://patient.info/treatment-medication/steroids/fingertip-units-for-topical-steroids>. (2019年7月3日現在)
- Van Zuuren EJ et al. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;2:CD012119.
- Weidinger S et al. *Nat Rev Dis Primers.* 2018 2018;4:1.
- The Pharmaceutical Journal.* <https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/atopic-dermatitis-dupilumab-and-crisaborole-could-herald-a-new-era-in-treatment/20202337.article?firstPass=false>. (2019年7月25日現在)

本活動は、ファイザー社による教育的助成金から支援を得ています。  
 本活動は、AKH社 (Advancing Knowledge in Healthcare)  
 およびCatalyst Medical Education社が共同で提供しています。